



Przed badaniem



Tydzień przed badaniem (nie wcześniej!) oznacz sobie stężenie kreatyniny we krwi. Wynik musisz przynieść do pracowni tomografii komputerowej - to dla ochrony Twojego zdrowia!



Podobnie, jeśli lekarz rozpoznał u Ciebie KIEDYKOLWIEK nadczynność tarczycy, oznacz we krwi stężenia fT4 i TSH. Wynik nie może być starszy niż 30 dni przed datą badania!




Zmierz sobie tętno (lub poproś o to lekarza). Jeśli będzie szybsze niż 70/min, weź receptę na lek zwalniający rytm serca, aby móc go zażyć w dniu badania.

W dniu badania



Leki, które przyjmujesz przewlekle, weź jak zwykle, o zwykłej porze.



Możesz zjeść coś lekkiego, ale na 2 godz. przed badaniem już niczego nie jedz.



Nie pij kawy i nie pal papierosów, aby nie przyspieszać rytmu serca.




Weź ze sobą wynik oznaczenia kreatyniny we krwi.



Jeśli miałeś/aś rozpoznaną nadczynność tarczycy, weź ze sobą wynik oznaczenia fT4 i TSH.



Przed wyjściem z domu zmierz sobie tętno - jeśli jest szybsze niż 70/min, przyjmij lek przepisany przez lekarza.



Weź ze sobą do pracowni lek przepisany na zmniejszenie tętna.